## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

(43) 国際公開日 2004 年4 月29 日 (29.04.2004)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2004/035817 A1

(51) 国際特許分類7:

C12Q 1/60,

1/26, 1/32, 1/44, G01N 33/92, C07J 1/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/013259

(22) 国際出願日:

2003年10月16日(16.10.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2002-301328

2002年10月16日(16.10.2002) J

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 協和 メデックス株式会社 (KYOWA MEDEX CO., LTD.) [JP/JP]; 〒104-0042 東京都 中央区 入船二丁目 1 番 1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および

(MURATA,Shigeru) [JP/JP]; 〒510-8502 三重県 四日市市 大協町二丁目 3番地 協和油化株式会社 四日市研究所内 Mie (JP).

- (74) 代理人: 岩橋和幸(IWAHASHI,Kazuyuki); 〒100-8185 東京都千代田区 大手町一丁目6番1号協和醱酵工 業株式会社 知的財産室 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR; TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(広域): ARIPO 特許(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## 添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD AND REAGENT FOR MEASURING CHOLESTEROL IN HIGH-DENSITY LIPOPROTEINS

(54) 発明の名称: 高密度リポ蛋白中のコレステロールの測定方法および試薬

(57) Abstract: A method of measuring cholesterol in high-density lipoproteins characterized by comprising reacting a specimen with cholesterol ester hydrolase and cholesterol oxidase, or cholesterol ester hydrolase, an oxidized coenzyme and cholesterol dehydrogenase in an aqueous medium containing a bile acid derivative and then measuring the thus formed hydrogen peroxide or reduced coenzyme; and a reagent to be used therein.

(57) 要約: 検体と、コレステロールエステル加水分解酵素およびコレステロール酸化酵素、または、コレステロールエステル加水分解酵素、酸化型補酵素およびコレステロール脱水素酵素とを、胆汁酸誘導体を含有する水性媒体中で反応させ、生成した過酸化水素または還元型補酵素を測定することを特徴とする高密度リポ蛋白中のコレステロールの測定方法およびそれに用いる試薬。

